

HOMME – 35-49 ANS

Recommandations de catégorie D/Contre fort

À ne pas faire - Preuves existantes pour ne pas recommander l'intervention

Recommandations NE PAS faire le dépistage	Notes
<ul style="list-style-type: none"> du cancer des testicules 	
<ul style="list-style-type: none"> du cancer de la prostate (APS et toucher rectal). Le clinicien pourrait décider de discuter de dépistage avec les patients ayant une histoire familiale (DÉCISION PARTAGÉE). Toutefois, aucune donnée ne soutient un dépistage différent pour ces hommes. 	

Recommandations de catégorie A/B/Pour fort/Pour faible

À faire - Preuves suffisantes pour recommander l'intervention

Recommandations	Notes
Counseling – Habitudes de vie/ITSS/UV	
- Tabagisme : définir le statut tabagique et intervenir si fumeur et prévention de l'initiation Fiche FMOQ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <i>Interventions possibles : counseling comportemental bref et pharmacothérapie</i> </div>	
-Alcool : dépistage de l'abus et counseling	
- Alimentation et activité physique : offrir ou référer pour interventions comportementales structurées si IMC entre 30 et 40 et à risque accru de diabète (risque accru = 33% ou plus sur 10 ans selon FINDRISC ou CANRISK) <div style="border: 1px solid yellow; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <i>Pour les adultes avec un IMC entre 25 et 29.9 ou entre 30 et 40 et pas à risque accru de diabète, il n'est pas clair qu'un counseling ou une référence soit bénéfique même si en soi une bonne nutrition et l'activité physique sont des facteurs importants d'une bonne santé.</i> </div>	
- ITSS : counseling préventif comportemental si à risque accru (pour facteurs de risque voir section investigations au verso) Fiche FMOQ	
- Mélanomes : conseiller d'éviter les coups du soleil et d'utiliser une méthode de protection UV physique et un écran solaire en complément	
Examen	
- Surplus de poids/obésité : dépistage par mesure de l'IMC	
-Hypertension artérielle : dépistage en mesurant la tension artérielle à chaque visite appropriée	
Immunisations – compléter la vaccination selon les recommandations du PIQ	
Vaccination de base à jour (Diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite, rougeole, rubéole, oreillons, varicelle si susceptible) Vaccin VPH (voir recommandations 2015)	

Investigations		
-Hb1ac : dépistage recommandé seulement si risque élevé ou très élevé de diabète selon calculateurs FINDRISC ou CANRISK. Calcul à effectuer aux 3 à 5 ans si facteurs de risque présents (ex : obésité, hypertension). -Fréquence du dépistage sanguin : Risque élevé : q 3-5 ans; Risque très élevé : q 1 an		
-Cholestérol : dépistage recommandé Par manque de données le USPSTF ne fait pas de recommandations sur la fréquence du dépistage mais considère qu'il est raisonnable de dépister aux 5 ans. D'autres instances recommandent aux 3-5 ans On ne devrait pas initier de statines en prévention primaire sans décision partagée		
- Chlamydia et gonorrhée : dépistage par prélèvement urinaire si facteur(s) de risque Fiche FMOQ <i>Facteurs de risque : nouveau partenaire, multiple partenaires, HARSAH, travailleurs du sexe et leurs clients, antécédent d'infection à chlamydia ou gonorrhée</i>		
- Syphilis, HIV, hépatite B et C : dépistage par prélèvement sanguin si facteur(s) de risque. <i>Facteurs de risque syphilis : HARSAH, personnes originaires d'une région où l'infection est endémique, travailleurs du sexe et leurs clients. Facteurs de risque hépatite B/C et VIH : personnes originaires d'une région où l'infection est endémique, travailleurs du sexe et leurs clients, utilisateurs de drogues par injection ou par inhalation, personnes incarcérées, exposition à du sang ou à d'autres liquides biologiques potentiellement contaminés.</i>		

Recommandations de catégorie I/C/Contre faible(Cf)

Pourrait être considéré - Données insuffisantes, conflictuelles ou de faible qualité

Recommandations	Notes
Counseling	
- Drogues illicites : dépistage par anamnèse (I)	
Examen	
- Dépistage de dépression (Cf)	
- Examen de la peau (I) et des muqueuses orales (I)	

Autres considérations	Notes
À appliquer selon le jugement clinique	
- Prévention des traumatismes : counseling (port de casque de vélo, port de ceinture de sécurité, etc.)	