

PÉDICULOSE (POUX DE TÊTE)

Maladie	Symptômes les plus fréquents	Transmission	Mesures additionnelles à mettre en place
Parasite vivant sur la peau de la tête dans les zones où il y a des poils.	Démangeaisons du cuir chevelu et présence de lentes collées près de la racine des cheveux, derrière les oreilles, à la nuque et, parfois, dans les sourcils.	Contact avec une personne infestée (tête à tête) et, moins souvent, par contact avec ses effets personnels (ex. : brosse à cheveux, chapeau).	Aucune mesure additionnelle à mettre en place. Appliquer les pratiques de base.

Particularités

Étant donné que les poux sont une nuisance plutôt qu'une maladie, le retrait de leur milieu ou des activités des personnes infestées devra être appliqué avec discernement lors de situations particulières (éclosion non contrôlée).

Mesures de prévention pour les travailleurs

Tous les travailleurs qui ont eu un contact important (tête à tête) avec le résident infesté devraient se faire examiner la tête afin de savoir s'ils n'ont pas été infestés. Traiter seulement les personnes infestées.

Personnel devant appliquer les mesures de prévention	<ul style="list-style-type: none"> □ Toute personne en contact avec un résident infesté.
Hygiène des mains	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Avec eau et savon. ▣ Avant de donner des soins au résident et après l'avoir fait. ▣ Après le retrait des gants. ▣ Après tout contact avec l'environnement du résident. ▣ En sortant de la chambre.
Gants non stériles à usage unique	<ul style="list-style-type: none"> □ Lors de l'application du traitement.
Blouse à manches longues	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Non.
Masque	<ul style="list-style-type: none"> □ Non.

Mesures de prévention pour les visiteurs

Visiteurs	<ul style="list-style-type: none"> □ Les visiteurs du résident infesté devraient être informés de la présence de poux et prendre les mesures nécessaires s'ils ont eu des contacts étroits avec le résident.
------------------	---

Mesures environnementales

S'assurer que les résidents ne partagent pas leurs peignes, leurs brosses à cheveux et leurs chapeaux. Reporter le rendez-vous chez le coiffeur après le traitement.

Entretien ménager (nettoyage et désinfection de l'environnement du patient: chaise d'aisance, toilette, baignoire)	<ul style="list-style-type: none"> □ Procéder selon la routine habituelle d'entretien ménager et lorsque les surfaces sont souillées.
Matériel de soins et équipement	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Apporter le minimum de matériel dans la chambre.
Matériel d'hygiène et de soins personnels	<ul style="list-style-type: none"> □ Faire tremper dans de l'eau chaude à environ 65 °C pendant 5 à 10 minutes, les brosses à cheveux et les peignes ou les faire tremper pendant 5 à 10 minutes dans un shampoing contre les poux non dilué.
Buanderie	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Le lavage peut se faire de façon habituelle avec un détergent commercial courant en utilisant de l'eau chaude ou tiède. ▣ Mettre les vêtements ayant pu être en contact avec les cheveux dans la sècheuse au réglage chaud, pendant 20 minutes, les faire nettoyer à sec ou les entreposer pendant 10 jours dans un sac de plastique. ▣ Laver la literie et la serviette à l'eau chaude dans un cycle de lavage régulier.
Vaisselle	<ul style="list-style-type: none"> □ Aucune mesure particulière.
Gestion des déchets et du matériel contaminés	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Sac de plastique fermé et jeté dans les ordures ménagères.